



LEADER

RAPESEED

KONCENTRUOTA
MIKROELEMENTINĖ TRĄŠA

10 L

RAPESEED

Koncentruota mikroelementinė trąša,
skirta rapsų, ankštinųjų ir kitų lauko
bei daržo augalų tręšimui per lapus

SUDĖTIS	Azotas (N):	32 g/l	3,2% w/w	(2,1% w/w)
	Kalcio oksidas (CaO):	126 g/l	12,6% w/w	(8,3% w/w)
	Magnio oksidas (MgO):	53 g/l	5,3% w/w	(3,5% w/w)
	Siera (S):	148 g/l	14,8% w/w	(9,8% w/w)
	Boras (B):	60 g/l	6,0% w/w	(4,0% w/w)
	Manganas (Mn):	22 g/l	2,2% w/w	(1,5% w/w)
	Molibdenas (Mo):	2 g/l	0,2% w/w	(0,1% w/w)
	Cinkas (Zn):	2 g/l	0,2% w/w	(0,1% w/w)

Koncentruota suspensija (SC) Fizikinis svoris: 1,49–1,53 kg/l

GRYNASIS KIEKIS: 14,9 KG

PAPRASTOSIOS SKYSTOSIOS TRĄŠOS.

FUNKCINĖ KATEGORIJA - AZOTO TRĄŠŲ TIRPALAS SU ANTRINĖMIS MAISTO MEDŽIAGOMIS IR MIKROELEMENTAIS.

IDENTIFIKAVIMO SĄRAŠO NR.: A.1.3.1.10

NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

1,0–2,0 l/ha su mažiausiai 200 litrų vandens. **Rapsai:** pradėti purkšti, kai rapsai turi 4 lapelius, kartoti kas 10–14 dienų pagal poreikį. Ypač naudinga panaudoti, kai rapsai pradeda auginti stiebą. Skatina tolygų augalų žydėjimą ir brandimą, gerina derliaus kokybę. **Pupos, žirniai, sojos, kiti lauko ir daržo augalai:** vegetacijos pradžioje, kai augalai turi pakankamai lapų sojų trąšų mišinį užpurkšti. Kartoti kas 10–14 dienų pagal poreikį, bet ne vėliau nei likus 4 savaitėms iki derliaus nuėmimo. **Pastaba.** Esant dideliam saulės aktyvumui ir temperatūrai aukštesnei nei +25° C produkto nenaudoti. **Purškiant rudenį, pagerėja pasėlio žiemkietiskumas.**

MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS

Prieš atidarant ir naudojant pakuočes turinį stipriai suplakti!

- Purkštuvo įrangą privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą ½ reikiamo vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą pilni reikalinga LEADER RAPESEED kiekį. • Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supilti likusį kiekį vandens ir nedelsiant sunaudoti. • Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

SUDERINAMUMAS

LEADER RAPESEED yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų, augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų. Del kitų maišymo galimybių kreiptis į produkto platintoją. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją, skirtą kitam misinio komponentui.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS LAIKYTI VIRŠ +5° C. LEADER RAPESEED laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gerimo ir gyvūnų pašaro.

SAUGOS PRIEMONĖS. LEADER RAPESEED nėra klasifikuojama kaip pavojinga medžiaga, remiantis CLP (REG EK 1272/2008). Sudėtyje yra 1,2-benzotiazolinono-3, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

Nepageidaujamos priemonės (mg/kg): chromas (VI) < 1,0, gyvsidabris < 0,01, švinas < 1,0, kadmis < 0,5, nikelis < 0,5, arsenas < 3,3, selenas < 0,5.

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą:
8 5 236 2052 arba 6 687 53 378.

KILMĖS ŠALIS JUNGTINĖ KARALYSTĖ (UK). **Pagaminimo data ir serijos nr.:** žiūrėti ant pakuočės.

PLATINTOJAS: UAB „AGROCHEMA“, Jonalauko k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos r., tel. 8 617 00 100, www.agrochema.lt

GAMINTOJAS: FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: +44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com
www.fmc-agro.co.uk

RAPESEED

Škistošs, koncentrėts mėslošanas līdzeklis,
paredzēts rapsu, pākšaugu un citu lauka un
dārza kultūru papildmēslošana caur lapām

SASTĀVS	Slāpekļis (N):	32 g/l	3,2% w/w	(2,1% w/w)
	Kalcija oksīds (CaO):	126 g/l	12,6% w/w	(8,3% w/w)
	Magnijs (MgO):	53 g/l	5,3% w/w	(3,5% w/w)
	Sērs (S):	148 g/l	14,8% w/w	(9,8% w/w)
	Bors (B):	60 g/l	6,0% w/w	(4,0% w/w)
	Mangāns (Mn):	22 g/l	2,2% w/w	(1,5% w/w)
	Molibdēns (Mo):	2 g/l	0,2% w/w	(0,1% w/w)
	Cinks (Zn):	2 g/l	0,2% w/w	(0,1% w/w)

Koncentrēta suspensija (SC) Fizikālais svars: 1,49–1,53 kg/l

Aplicības Nr. H0.04-1756-18

LEADER RAPESEED - šķistošs mēslošanas līdzeklis, paredzēts, lai nodrošinātu augus ar optimālu nepieciešamo barības vielu daudzumu. Veicina vienmērīgu augu ziedēšanu un nobriešanu, uzlabo ražas kvalitāti.

LIETOŠANAS DEVA

1,0–2,0 l/ha ar vismaz 200 litriem ūdens. Nodrošinot vienmērīgu lapojuma apsmidzināšanu.

LIETOŠANAS LAIKS

Rapsis: sākt smidzināt, kad rapsiem ir četras lapas; pēc nepieciešamības smidzināt ik pēc 10–14 dienām. Īpaši svāri ir veikt smidzinājumu, kad rapsiem virs lapojuma sāk pacelties ziedpumpuri un notiek stublāja pagarināšanās - augi strauji veido lielu zaļo masu. **Pupas, zirņi, soja un citi lauka un dārza kultūras:** Veģetācijas sākumā, kad augiem jau ir pietiekami liels lapojums, lai varētu veikt papildmēslojuma smidzinājumu caur lapu virsmu. Ja nepieciešams, smidzināšanu atkārtot ik pēc 10–14 dienām, bet ne vēlāk kā četras nedēļas pirms ražas novākšanas. **Piezīme.** Ražotājs Headland rekomendē pēc iespējas biežāk veikt augus un augu analīzes, lai nodrošinātu, ka sējums saņem optimālu barības vielu daudzumu. Produktu nelietot tiešos saules staros vai apstākļos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25 °C. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu ieteicams veikt vakarā vai agri no rīta, kad augs ir uzkrājis pietiekami daudz mitruma. **Apsmidzinot rudenī, uzlabojas sējuma ziemcietība.**

SMIDZINĀJUMA JUMA SAGATAVOŠANA

Pirms atvēršanas un lietošanas iepakojumu spēcīgi sakratīt!

- Smidzinātāja iekārtai jābūt tīrai. Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar ½ nepieciešamā ūdens daudzuma un ieslēgt maisītāju. Maisot iepildīt rezervuārā nepieciešamo LEADER RAPESEED daudzumu. • Nelaut maisījumam stāvēt bez maisīšanas. Pieliet atlikušos ūdens daudzumu un nekavējoties izlietot maisījumu. • Pēc lietošanas rūpīgi izmazgāt smidzinātāju.

SADERĪBA

LEADER RAPESEED ir fiziiski un ķīmiski saderīgs ar lielāko daļu pesticīdu, augšanu regulējošām vielām un mikroelementiem. Par citām maisījuma iespējām vērsties pie produkta izplatītāja. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt citam maisījumam komponentam paredzēto ražotāja instrukciju.

GLABĀŠANA: Sargāt no sasalšanas. Glabāt +5°C temperatūrā. LEADER RAPESEED glabāt vēsā, labi vēdināmā, glabāšanai paredzētā telpā. Neglabāt tiešos saules staros vai tiešu siltuma avotu tuvumā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem, dzērieniem un lopbarības.

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt lietošanas devu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI. LEADER RAPESEED saskaņā ar CLP (REG EK 1272/2008) netiek klasificēta kā bīstama viela. Satur 1,2-benzotiazolinonu-3, kurš var izraisīt alerģisku reakciju. **Avārijas gadījumā ziņot** ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

RAŽOTĀJS: Apvienotā Karaliste (EU). FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: +44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

www.fmc-agro.co.uk **Sērijas Nr.:** skatīt uz iepakojuma.

IZPLATĪTĀJS: SIA "Agrochema Latvia", "Agrocentrs", Dzintmīsa, Iecavas novads, LV-3913,

tel. +371 63 941 223, www.agrochema.lv

AGROCHEMA FMC

Pakuotė:
Iepakojums: 10 L

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS A/S,
THYBORŅVEJ 78, 7673 HARBORE,
DANIJA. TEL.: 45 96909690

